



# MIG-82

## Maladies Infectieuses Gazette

Montauban le 16/06/2020

Chères consœurs, chers confrères

En cette période de déconfinement estival, les sorties en milieu naturel maintenant autorisées vont multiplier le risque de contact entre les humains et les arthropodes hématophages tels que les tiques. L'occasion pour nous de rappeler les principales recommandations 2019 de prise en charge de la maladie de Lyme.

Numéro 3 : Borreliose de Lyme et maladies vectorielles à tique

Rédaction : Dr marc de LAVAISSIERE

Relecture : Dr guillaume BELLAUD ; Dr julien CUZIAT

Pour toute suggestion : [infectiologie\\_gh\\_82@ch-montauban.fr](mailto:infectiologie_gh_82@ch-montauban.fr)

# MIG-82

## Maladies Infectieuses Gazette

### 1. Histoire naturelle de l'infection par *Borrelia sp*

En cas de pique par une tique le risque de développer une maladie de Lyme est inférieur à 5%.

Les formes localisées apparaissent en moyenne dans les 7 à 30 jours qui suivent la pique de tique.

La présentation principale, et la plus fréquente, est l'*erythema migrans*, d'extension centrifuge, non ou peu prurigineux.



Suivent les formes disséminées précoces jusqu'au 6<sup>e</sup> mois puis les formes disséminées tardives.



# MIG-82

## Maladies Infectieuses Gazette

### 2. Place des tests diagnostiques en phase précoce

Il n'y a aucune place pour la sérologie-ou d'autres tests- dans le diagnostic de la maladie de Lyme en phase précoce, de type *erythema migrans*.

En cas de piqure de tique, extraire la tique, si possible avec une pince fine, laver la peau au savon de Marseille et surveiller pendant les 4 semaines qui suivent. Aucune indication à un test diagnostique dans ce délai.

Il n'y a pas d'indications pour un traitement prophylactique de la maladie de Lyme.

### 3. Thérapeutique de la forme précoce *erythema migrans*

Antibiotique		Posologie journalière	Durée (jours)
Adulte et enfant de plus de 8 ans			
Première ligne	Doxycycline	100mgx2	14
Deuxième ligne	Amoxicilline	1gx3	14
Enfants de moins de 8 ans			
Première ligne	Amoxicilline	50mg/kg	14
Deuxième ligne	Azithromycine	20mg/kg	5



# MIG-82

## Maladies Infectieuses Gazette

4. Que faire en cas de doute ou pour les formes tardives

- ✓ Prendre rendez-vous en consultation (avec courrier médical) auprès du secrétariat au numéro suivant :

05 63 92 81 65

- ✓ Nous contacter en téléphonant au secrétariat et en demandant l'infectiologue d'avis ; pensez à prendre des photos ou à demander à vos patients de vous les procurer, et merci de nous les transmettre par mail à l'adresse qui suit, après nous avoir fait part du dossier par téléphone :

[infectiologie\\_gh\\_t\\_82@ch-montauban.fr](mailto:infectiologie_gh_t_82@ch-montauban.fr)

Référence :

Recommandations des sociétés savantes Françaises ; médecine et maladies infectieuses, 2019

<https://doi.org/10.1016/j.medmal.2019.04.381>